

Termo de Ciência e Consentimento para inserção implante subdérmico de etonogestrel

Eu, _____, declaro que fui esclarecida sobre o procedimento de inserção do implante contraceptivo, assim como dos seus efeitos colaterais, complicações, eficácia e tempo de ação.

Efeitos colaterais:

1. Perda do padrão regular de sangramento menstrual, que assume periodicidade irregular e inesperada, onde pode acontecer desde a ausência de menstruação, menstruar bimensalmente, menstruar mensalmente ou, mais raramente, mais de duas vezes ao mês. O sangramento em pequena quantidade tipo "borra de café" por período prolongado também pode acontecer.
2. Espinha, dor de cabeça, aumento de peso, endurecimento e dor nas mamas.
3. Alopecia (queda de cabelo), humor depressivo, labilidade emocional (humor instável), alterações na libido, dor na barriga, dismenorréia (cólica menstrual), perda do apetite, aumento de gases
4. Prurido (coceira), hematoma, dor leve e irritação no local da inserção do implante. Eventualmente pode haver cicatriz no local.

Complicações (raras):

1. Infecção no local da inserção.
2. Inserção profunda do implante, sendo necessário suporte dentro de centro cirúrgico com anestesia para sua retirada.
3. Alergia ao anestésico usado para inserir o implante.

Eficácia:

Todo método anticoncepcional é avaliado por um índice chamado de Índice de Pearl que significa o risco de falha do método no período de um ano em um grupo de 100 mulheres. No caso do implante de etonogestrel índice é de 0,05 mulheres/ano, ou seja, em cada 10.000 mulheres, 5 irão engravidar no período de um ano dentro das usuárias do implante.

Tempo de ação:

Após a sua inserção, o implante subdérmico de etonogestrel tem tempo de ação de 3 anos.

Declaro que fui esclarecida sobre o conteúdo acima, tive a oportunidade de esclarecer minhas dúvidas e ciente de efeito colaterais, complicações, eficácia e tempo de ação, solicito a realização da inserção do implante no dia de hoje. Estando de pleno acordo com o procedimento.

_____, _____ de _____ de _____.